ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

1.re

Observations De Chirurgie

n.o 252.

1.re Sur un abcès devenu fistuleux au dessous du pli de l'aine, par un dépôt de lait, avec circonstance singulière.

2.e Sur un abcès des plus considerable de la cuisse, par un dépôt de lait, suivi d'une solution de malignité.

3.e Sur un abcès de la région hypogastrique, par un dépôt de lait.

4.e Sur un abcès très considerable au fondement.

5.e Sur un abcès fistuleux au fondement occasioné par une Eguille a broder.

6.e Sur un abcès au fondement occasioné par une arrete de morüe.

7.e Sur une fistule invetéré a l'anus.

8.e Sur un abcès au fondement.

9.e Sur une fistule a l'anus.

10.e Sur une fistule angenoüe avec hemorragie.

11.e Sur une fistule avec Carie au bord du fondement.

12.e Sur une fistule avec Carie a la joüe.

13.e Sur l'Etat du poulmon d'un Enfant mort en naissant.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 2 od. 38

Le But principal que doit se proposer quiconque entreprend de mettre au jour ses recherches, et observations, doit être de contribuer au bien de l'humanité et au progrès de l'art en exposant avec netteté et precision les differens moyens que la pratique a pû lui fournir pour abreger les souffrances des hommes et prolonger leurs jours autant qu'il est possible suivant l'ordre de la providence.

J'ay tâché dans mes observations de joindre à la verité des faits, l'ordre et la precision en evitant les details minutieux des remedes generaux qu'il faut toujours supposer dans toutes les cures, me renfermant dans les circonstances merveilleuses, et n'avançant rien que je ne puisse prouver par des attestations les plus authentiques.

J'ose donc encore presenter à l'academie, ce Cahier, dans la confiance que suivant qu'il est dit dans la preface du premier tome de ses memoires

» Elle ne refusera pas meme les observations qui sont
» les plus communes, parcequ'elles renferment toujours
» des circonstances differentes, souvent plus utiles
» que le principal objet qui a attiré l'attention de
» l'observateur . . . . . Des observations rebutées
» par quelques physiciens des phenomènes qui paroissoient
» s'ecarter des routes ordinaires de la nature, ont été
» justifiées par une suite de faits dont l'authorité
» a fait evanouir tous les doutes.

---

oubien il faudroit croire que les urines auroient aussy pris leur cours par l'ouverture.

Quelle a été encore la voye de l'evacuation d'une hydropisie par les urines, dont j'ay donné a l'académie l'observation en 1744.

Ce sont autant de phenomenes qui doivent exciter la sagacité et l'Emulation des anatomistes a rechercher les routes extraordinaires de cet evacuations et la cause de ces guerisons Enygmatiques.

Observation 4.e

Sur un abcès tres considerable au fondement.

une dame agée d'environ 72 ans, des plus puissante qu'on puisse imaginer, avoit au fondement un abcès fistuleux pour lequel fut faite une consultation de medecins et Chirurgiens Le 26. janvier 1734. L'operation fut decidée j'en fus chargé, et je la fis le lendemain en presence des consultants.

j'introduisis dans l'ouverture de la fistule une sonde cannelée au moyen de laquelle je fis avec le bistouri une incision d'abord a la partie inferieure longue de deux travers de doigts, ensuitte j'en fis une semblable a la partie supérieure, cette longue incision se trouvoit a deux travers de doigts de l'anus, j'etois assuré que la fistule ne penetroit pas dans le rectum

je portay Le doigt dans la playe et rompis plusieurs brides, apres m'etre assuré qu'il n'y avoit plus de Clapiers, je la remplis de charpie dont il en entra a peu pres gros comme le poing, comme il etoit a craindre que les graisses fondues en suppuration n'altaquassent l'intestin, je ne differay pas l'operation et ne fis deux Saignées que les jours suivants, j'ay pensé la playe avec les remedes ordinaires jusqu'au 16. mars suivant que Lad. Dame a été parfaitement guerie et sans aucune autre incommodité, malgré une cpte telle dont je la traittay en meme tems, et qui Luy avoit été communiqué par les fumées de Chambre.

Observation 5e.

Sur un abcès fistuleux au fondement, occasionné par une Eguille a Broder.

Le 6. janvier 1747. J'ouvris un abcès des plus Considerable et gangreneux proche l'anus, une dame agée d'environ 43 ans, apres avoir Sufisamment dilaté L'ouverture, je portay le doigt dans le fond pour en decouvrir les Clapiers et les ouvrir, je sentis entre parcourant un Corps Etranger que je tiray et je reconnus que c'etoit une Eguille a broder, Le sejour de la matiere avoit aminci les environs de l'anus ou il s'est

Deux ouvertures fistuleuses de que j'ouvris aussy sans interesser l'anus ny le Sphincter, j'ay pensé avec les remedes ordinaires, et la malade a été parfaitement guerie Le 25. fevrier suivant, n'en a depuis ressenti aucun mal et se porte encore fort bien actuellement.

Observation 6.e

Sur un abés au fondement, occasionné par une arrete de morüe.

Le 8. avril 1751 je me suis transporté a Jumey gros Bourg a 3 Lieües d'auxerre pour voir une dame agée pour lors de 66. ans, elle avoit toute la circonference de l'anus transfiée par un abés en forme d'entonoir, tres douloureux et menaçant de gangrene, comme il etoit tems d'en faire l'ouverture, voicy comme je la fis.

Quoy qu'il y eût lieu de croire que le sejour de la matiere avoit detruit l'intestin, j'entrepris de ne point toucher au Sphincter, quoyque le Chirurgien ordinaire pretendit que je devois faire l'operation comme dans une fistule Complette, je fis donc une incision oblique en montant d'un coté de l'anus, et une semblable de l'autre ce qui formoit un V renversé ainsy Λ laissant un milieu a l'anus sans y toucher non plus qu'au Sphincter, je passay ensuitte le doigt dans toute la cavité pour debrider les sinus et Clapiers, mais je fus fort etonné lorsque je sentis resister sous mon doigt un Corps etranger

que je tiray Et remis sur la main de feu m.r Chirac
Medecin du roy qui assistoit a cette operation, pendant
que je finissois et pansois la gangrene, on lava le corps
Etranger qui se trouva estre une arrette de morüe,
je laissay entre les mains du Chirurgien ordinaire,
La malade, que je retournay voir quatre jours apres
Et tout alloit a merveille, cette dame a été parfaitement
guerie et se porte encore actuellement fort bien

Observation 7.e

Sur une fistule inveterée de l'anus.

un m.r ... curé a 7 lieües d'auxerre agé d'environ
55 ans portoit depuis long tems une fistule borgne
interne a l'anus, il vint en cette Ville pour se faire
traitter Le 11. janvier 1746; je le pansay jusqu'au
18. dud. que je fis une ouverture par laquelle je
decouvris 6 ou 7 Clapiers avec Callosités, dont la
fistule s'avançoit jusqu'au plus loing de la portée du doigt
sous le Coccix dont je craignois la carie, je fis appeller
en consultation feu m.r Bourgoin mon confrere,
La denudation de l'intestin et la sortie des graisses
En suppuration nous determina a l'operation que je
fis Le 5. fevrier, je me servis pour la premiere Et
derniere fois du syringotome, je me contentay de
traverser sans rien retirer, je scarifiay les Callosités

qui a la verité nous donnerent bien de la peine a consumer mais enfin le malade gueris parfaitement dans l'espace d'environ cinq mois, et il se porte encore tres bien.

Observation 8.e

Sur un abcès au fondement.

Le 15. 8.bre Dernier 1758 je fus mandé a St Bris petite ville a deux lieües d'auxerre pour Mr. le curé agé d'environ 60 ans, aquis un de chirurgiens de lad.e Ville avoit ouvert deux jours auparavant un abcès qui occupoit toute la fin conference de l'anus et qui etoit survenu a la suitte d'une chutte du fondement; Le chirurgien qui est le meme qui a traitté Madame qui a fait le sujet de la 6.e observation a fin d'oter toute motif.e de l'exemple, l'ay il avoit ouvert l'abcès de Mr. le Curé tout autour sans interesser l'anus ny le sphincter qui etoit isolé et detaché dans toute sa circonference, il restoit a la partie inferieure a coté du raphé un sinus profond de la longueur du doigt, pour eviter d'ouvrir l'uretre dans la contre ouverture que je conseillay, je fis prendre au chirurgien un dés acoudre non percé qu'il porta au bout d'un doigt jusqu'au fond du sac en tirant du coté de la cuisse, sur lequel il fit la contre ouverture, et je passay une méche correspondante a l'ouverture superieure pour determiner la suppuration a la partie

La plus declive, et facilites la Cicatrice autour de l'anus je fis liquefier le Digestif ordinaire par l'addition du vin miellé, afin de faire plus facilement regorger l'onguent dans les fistules, je recommandai sur tout de garder toujours le malade le Ventre appuyé sur le bord du lit, les pieds par terre sur un oreiller situation la plus avantageuse pour la prompte guerison, j'apprends que le malade fut guéri incessament.

Observation 9.e

sur une fistule a l'anus

Le 17. du mois dernier 9.bre 1758, je fus appellé a Cravant petite ville a 4 lieües d'auxerre pour voir un homme agé de 64 ans a qui l'operation de la fistule a l'anus avoit été faitte par un des Chirurgiens du lieu il y avoit trois mois et plus, je trouvai le malade extremement affoibli, mais plein de courage.

J'apperçus d'abord a la marge de l'anus du Coté droit d'incision qui avoit été faitte, j'introduisis le doigt dans l'ulcere qui Etoit Calleux partout, il avoit trois travers de doigt de profondeur, il Etoit entierement separé du rectum par une partie du Sphincter qui formoit une Bride ou Cloison Calleuse de l'Epaisseur du doigt et large de deux travers, je n'eus point d'autre parti a prendre que Celui de n'en point voir

l'operation, en portant le stilet dans le fond de l'ulcere, percant ensuite le rectum au dessus de la cloison, apres avoir replié le stilet je tranchay tout ce qui etoit contenu dans l'anse, et je scarifiay plusieurs clapiers calleux, je ne crus pas devoir les extirper parceque le sujet etoit extremement maigre et que les callosités etoient adherantes a la tuberosité de l'ischion; j'ay laissé le malade entre les mains du Chirurgien ordinaire qui travaille a consumer les callosités.

Reflexions

Lorsque tous les auteurs font d'abord a definir la fistule un ulcere sinueux, calleux, profond, dont l'entrée est etroite et le fond large; on ne peut cependant disconvenir que tous les jours on voit des fistules en differentes parties du Corps sans callosité, et qui ne sont pas moins de vrayes fistules, c'est ce qui a fort bien remarqué M.r Sharp qui dit, " que, sans s'arreter a la signification exacte du mot de fistule " on entend generalement par fistule a l'anus, un abcès qui " s'etend au dehors et au dedans de l'intestin rectum, il est " vray, continue-t-il, qu'un abcès dans cette partie, quand " une fois il est ouvert, ne manque guere, si on le neglige, " de devenir calleux dans sa cavité et dans ses bords, et " c'est ce qui forme alors ce qu'on appelle proprement fistule.

Il est donc d'une consequence infinie de ne point negliger dans leurs commencements les abcès du

fondement dont la matiere doit se former plus promptement qu'ailleurs par la chaleur de son foyer, il faut donc les ouvrir le plus tost qu'il est possible, crainte que le séjour de la matiere après avoir reduites en suppuration les graines qui environnent l'intestin, n'y fasse une ouverture, ce qui feroit une fistule borgne interne.

En s'y prenant de bonne heure il suffit ordinairement de les ouvrir assez largement, on évite par ce moyen bien des fistules, comme on peut voir par les observations 5. 6. et 8.e Quoyque l'Eguille à brider et l'anneau de morin eussent bien certainement percé l'intestin audessus du sphincter, les abcès que les Corps étrangers avoient occasionnés profondement, n'ont pas laissé de guerir sans faire l'operation de la fistule à l'anus, ne leur ayant pas donné le tems de devenir intestin ny de devenir Calleux; et quand l'abcès auroit meme percé de luy meme et fait une fistule borgne externe, il suffiroit encore pour le guerir, d'agrandir l'ouverture sans toucher au sphincter ny à l'anus, comme on voit dans l'observation 4.e

Mais lorsqu'on n'est plus à temps de faire seulement une ouverture, ou d'agrandir celle qui est faite, que le boyau est deviné ouppuré, il faut necessairement en venir à l'operation dans les regles, qui est toujours faite au tranchant seulement ce qui se trouvoit renfermé dans l'anse de la fistule, pratique qui m'a toujours reüssy

Dans nombre d'opérations que j'ay faites, et dernierement encore de 12. 7bre je fis a un c Houssieux . . . prieur
Rigny- d'une maison de Bernardins, agé de 59 ans, l'opération d'une fistule complette a l'anus profonde de trois travers de doigts, en reünissant les deux ouvertures sans rien emporter il a été parfaitement guéri le 8bre dernier

Cependant nombre de Chirurgiens prenant la definition de la fistule à la lettre, et sans s'embarasser si une fistule est calleuse ou non, font pour toutes indistinctement un Circuit autour du fistule, et emportent une partie considerable de la marge de l'anus, et quelquefois du sphincter dont la deperdition de substance met le malade dans l'impuissance de retenir les excrémens. Et le remede devient pire que le mal.

il y a bien 20. ans qu'une demoiselle d'environ 22. ans alla a Paris ou l'operation luy fut faite par l'extirpation, elle revint ne pouvant aucunement retenir les excrémens, ce qui la reduisit dans un etat de langueur et d'ennui qui la fit perir.

Quelques années après un Chirurgien de cette Ville la fit de même a un de nos bourgeois, et jusques la mort environ 15 ans après il a eû ce qu'il appelloit un devoyement, ce qui n'étoit rien moins qu'une incontinence d'excrémens.

Pourquoy donc, lorsqu'il n'y a point de calloſité faire l'operation comme s'il y en avoit? ne peut-on pas se contenter de la faire comme on l'a faite au Roy Louis 14. en reünissant deux ouvertures en une seule

Comme on fait a celles qui se trouvent suivant la
Rectitude des membres des Extremités? n'avoit-on pas
mesme inventé un Bistouri tres droit avec un filet au
bout appellé Syringotome avec lequel on faisoit l'opération
d'un seul coup? aujourd'huy qu'on est sur le pied d'extirper
on ne Connoit plus cet instrument, il est vray qu'il
avoit ses inconveniens, je ne m'en suis jamais servi
qu'une fois, comme j'ay dit dans l'observation 7e
Et je preferre le Bistouri.

Observation 10e

Sur une fistule au genoüil avec hemorragie

Le 24. may 1751. on Vint me prier d'aller voir
un homme reduit a l'extremité par une hemorragie
au genoüil, je m'informay de quoy il s'agissoit, j'appris
que cet homme etoit tombé sur la cuisse droite il y
avoit un mois, que depuis cette un de mes Confreres
l'avoit ouvert, et luy avoit mesme fait une petite ouverture
au genoüil par laquelle en Comprimant l'artere
Crurale au dessus de la cuisse, depuis la partie inferieure
de la moyenne, il faisoit sortir tous les jours une
quantité prodigieuse de sang qui avoit reduit le
malade a un dernier marasme.
je me transportay Chez le malade que je trouvay
avec le Chirurgien ordinaire, je trouvay depuis la

l'artie supere. latérale externe de la cuisse jusque sur
la rotule une substance de bourgeons charnus, en la
comprimant il en sortoit par la petite ouverture fistuleuse
quantité de sang, ou me proposa des injections dont
je me fus grand avis, et je dis qu'il falloit aller au fond
qu'il y avoit au partie supere. de la fistule quelques vaisseaux
d'ouverts sous les tegumens qui, faute d'être comprimés
causoit l'hemoragie ; qu'il falloit comprimer la petite
ouverture du pus qui fut guerie en 24 heures,
le sang n'ayant plus d'issue s'amassa au milieu
de la cuisse, et un moyen d'une incision que je proposay
je Repondois que l'hemoragie cesseroit, mais on souffrit
ne voulut point se rendre a ma proposition, et je
deffendit meme de la fistule comptant que mon projet
ne réussiroit pas, il n'y eut que l'evenement qui le
convainquit, je fus donc obligé de faire l'ouverture
le sur lendemain de mon premier visite, par petite
ouverture que je fis d'environ trois travers de doigts de
longueur, je detachay avec le doigt tous les caillots de
sang qui je firs sortir, je pansay ensuite et comprimay
l'orifice du vaisseau assurant qu'il n'y auroit plus
d'hemoragie a l'avenir, mon souffrue me soutenoit
soutenoit qu'elle seroit encore plus grande a cause de
l'incision, et crût triompher le lendemain en levant
l'appareil, mais il fut fort etonné de voir qu'avec
toutes les frictions qu'il avoit accoutumé de faire

il ne pût faire sortir de sang, je la pansay encore cette fois seulement, et j'appris par la suitte du malade même qu'il avoit été entierement guéri 15 jours après l'incision.

Les Jeunes Chirurgiens doivent apprendre qu'il ne faut pas mépriser les avis des anciens, cette observation en est un exemple puisque le malade qui étoit prest d'expirer a été tiré des bras de la mort par mon avis.

Observation II.e

Sur une fistule avec Carie au bas de la femur

un Enfant d'environ 12 ans avoit eu un abcès à la partie infer.re latérale externe de la fesse sur le fondement de la femur, il luy estoit resté une fistule pour laquelle il fut mis à l'Hôtel dieu, je connus par la sonde que l'os étoit carié, je voulus mésurer la profondeur et pour cy mon stilet qui entra dans le corps de l'os de plus de trois travers de doigts, ce qui me fit voir des espoirs de guerison parceque c'étoit proche de l'article et dans la partie la plus poreuse du femur; après pansé toute operation; environ 12 jours après je l'examinay de nouveau et je trouvay la fistule fermée, de sorte que ce ne fut pas pour longtems, mais elle a été parfaitement guerie, il y a apparence que le stilet avoit occasioné l'exfoliation de quelques particules d'os dont il se nourrissoit ayant percé la plaie y avoit fait un trou.

De même qu'il ne faut pas toujours se flatter de guerir

Demesme aussy on a quelque fois tort de decider incurables des maladies que lón voit guerir peu de temps après, lób lervation suivante en fournit encore un exemple.

Observation 12.e

Sur une fistule avec carie a la joüe

Le 24. 9.bre 1757 je fus mandé pour une demoiselle agée de 22. ans, apres a la suitte d'un coup de soleil qu'elle avoit essuyé a la teste plusieurs mois auparavant, il vint sur la joüe droite une fluxion qui s'etendit depuis le front jusqu'au col, et forma un bruit de pelotton monstrueux qui s'ouvrit au dessous de l'oeil sur le bord de la partie inferieure de l'orbite, les remedes generaux ne furent point negligés, j'avois plusieurs fois proposé l'ouverture, craignant que le sejour de la matiere n'altérât l'oeil, mais les parents qui craignoient pour cet oeil, parce qu'elle avoit deja perdu l'autre dans son bas age, s'y opposerent et regardoient ce mal comme de la gravité auquel ils ne vouloient pas que lón touchât, il ne me fut pas permis d'y porter la sonde pour reconnoitre l'état de l'os que je soupçonnois altéré, je fus obligé de me servir d'eponge preparée pour dilater, et de mettre sous le drap la priere divine pour contenir les accroissements, la langueur de la playe impatientoit les parents, malgré l'assurance que je leur donnois d'une guerison radicale, j'eus quelque dispute et voulois plusieurs fois me retirer, mais je faisois reflexion que si j'abandonnois la playe, la guerison pourroit suivre de pres quelque exfoliation, je pris patience

parce que j'avois affaire à des personnes de Considération, Enfin Le 12. fevrier et jours suivants plusieurs os qui s'étoient détachés du bord de l'orbite, se presentèrent de l'ouverture, je les tirai, la fistule se ferma et fut parfaitement guerie Le 1.er mars 1758.

Il ne faut donc jamais desesperer de la guerison a moins que les playes ne soient mortellement incurables.

Observation 13.e

Sur l'Etat du poulmon d'un Enfant mort en naissant

Le 28. 9.bre 1756. En Execution de l'ordonnance de mons.r Le Lieut.t particulier au bailliage Criminel d'auxerre, sur le Req.te de M.e Le procureur du roy, j'ay fait a l'hôtel dieu en presence de MM Les juges et de MM Roullet medecins, l'ouverture d'un Enfant mâle nouveau né qui avoit été exposé et trouvé mort, Lequel m'a paru etre venu au monde un terme d'environ neuf mois, j'ay remarqué que le cordon ombilical qui etoit de la longueur d'un pied n'avoit pas été lié..... ayant ouvert la poitrine j'ay trouvé le lobe droit du poulmon Leger, les vesicules remplies d'air, et le Lobe gauche de couleur brune, compact, et lourd, ayant jetté le dernier dans l'eau il est tombé tout y tout au fond, au lieu que le premier a nagé sur l'eau, d'ou j'ay conclu que l'Enfant dont je vous qu'on m'avoit vu venant au monde et que les personnes qui l'ont vu naître et mourir en mesme tems, ont

suivant toute apparence, crû inutil de lier le cordon ou bien que la mere est accouchée seule &

Reflexions

Cette observation est plus importante qu'on ne pense, suivant la Coutume de ces pays cy, lors qu'une femme n'a pas d'autre enfant que celuy dont elle accouche et qu'elle meurt en couche si l'enfant survit, le pere herite de son enfant de toutes effets mobiliers, il est donc de grande Consequence que les chirurgiens se mettent au fait de l'experience susdite, puisque dans le cas ils sont les seuls sur le temoignage desquels on puisse statuer en justice lorsqu'il s'eleve entre le mary et les heritiers de la femme quelque Contestation pour raison de la succession mobiliaire, Car l'enfant qu'on tireroit meme par l'operation Cesarienne, n'auroit-il respiré qu'une fois seroit Censé avoir survecu la mere, parceque jusqu'icy la mere a été reputée morte lorsqu'on fait l'ouverture pour tirer l'enfant, quoyqu'il y ait des exemples de femmes qui ont vecu après l'operation, Le cas n'est pas encore assez solidement decidé, Car si des femmes ont survecu Cette que l'operation n'avoit que été faite pour Cause de maladie, mais par raison d'impossibilité d'accoucher autrement a Cause du defaut de Conformation de la mere ou de la Grosseur de l'enfant.

J'ay eu occasion de decider quelquefois dans

24.

ces Cas, ce qui devient de Consequence a proportion
des richesses des familles, dont le pere se trouve
heritier de tout le mobilier; si par exemple dans
l'ouverture de l'Enfant qui fait le sujet de l'observation
cy dessus on n'eut examiné que le lobe gauche du
poulmon, on auroit decidé que l'enfant n'avoit
point vecu apres sa naissance, on ne sçauroit donc
estre trop attentif a toutes les circonstances qu'on est
obligé de constater dans les ouvertures de cadavres
puisque souvent il s'agit de justifier ou condamner
des accusés. +

Le 14. Xbre 1758. Lessuré